

Guerra aos vermes
ASCAR.

Fôlder / 1983

Cód. Acervo: 43652

© Emater/RS-Ascar



Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.12287/43652>

Documento gerado em: 07/11/2018 21:03

O Repositório Institucional (RI) da Extensão Rural Gaúcha é uma realização da Biblioteca Bento Pires Dias, da Emater/RS-Ascar, em parceria com o Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEDAP/UFRGS) que teve início em 2017 e objetiva a preservação digital, aplicando metodologias específicas, das coleções de documentos publicados pela Emater/RS- Ascar.


Os documentos remontam ao início dos trabalhos de extensão rural no Rio Grande do Sul, a partir da década de 1950. Portanto, salienta-se que estes podem apresentar informações e/ou técnicas desatualizadas ou obsoletas.

1. Os documentos disponibilizados neste RI são provenientes da coleção documental da Biblioteca Eng. Agr. Bento Pires Dias, custodiadora dos acervos institucionais da Emater/RS-Ascar. Sua utilização se enquadra nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
2. É vetada a reprodução ou reutilização dos documentos disponibilizados neste RI, protegidos por direitos autorais, salvo para uso particular desde que mencionada a fonte, ou com autorização prévia da Emater/RS-Ascar, nos termos da Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
3. O usuário deste RI se compromete a respeitar as presentes condições de uso, bem como a legislação em vigor, especialmente em matéria de direitos autorais. O descumprimento dessas disposições implica na aplicação das sanções e penas cabíveis previstas na Lei de Direito Autoral, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e no Código Penal Brasileiro.

Para outras informações entre em contato com a Biblioteca da Emater/RS-Ascar - E-mail: biblioteca@emater.tche.br

DOSIFIQUE NAS ÉPOCAS CERTAS

■ no desmame



■ na tosquia

■ 20 a 30 dias:

- antes do encarneamento;
- após o final do encarneamento;
- antes do início da parição;
- após o final da parição.

São necessárias outras dosificações. A época depende do clima.

Para Maiores Informações Procure o Técnico

Realização Conjunta:



EMBRAPA

UEPAE/BAGÉ


vinculada ao Ministério da Agricultura



EMATER-RS

associada à EMBRATER
vinculada à SECRETARIA DA AGRICULTURA

GUERRA AOS VERMES



**Amigo
Criador**

A verminose é o maior inimigo da ovelha. Quando ela se manifesta, é prejuízo certo.

Muitas vezes, os efeitos dos vermes não são notados. Mesmo assim, eles podem estar diminuindo os seus lucros.

OS VERMES CAUSAM GRANDES PREJUÍZOS

- Baixam a produção e a qualidade da lã.
- Diminuem a produção de cordeiros.
- Atrasam o desenvolvimento do rebanho.
- Reduzem o desfrute e a produção de carne.
- Aumentam a mortalidade.

COMECE PELO MANEJO

1. Não aperte a lotação.
2. Evite os campos baixos e úmidos.
3. Alimente bem o rebanho. É o jeito de aumentar a resistência contra os vermes.
4. Use o pastoreio alternado com bovinos adultos. É a maneira de descontaminar os campos.

SAIBA QUE

**SÓ O VERMÍFUGO NÃO CONTROLA OS VERMES.
O MANEJO DO REBANHO TAMBÉM É IMPORTANTE.**

FAÇA O VERMÍFUGO FUNCIONAR

- Siga sempre as instruções da bula.



- Confira a pistola dosificadora, antes de iniciar cada serviço. Use um copo graduado, seringa ou qualquer outro medidor.



- Dê a dose certa a cada animal. Para isso, se baseie na média do peso dos animais mais pesados do lote.



- No inverno use somente vermífugos de ação ampla.



ATENÇÃO

OS OVINOS JOVENS PRECISAM DE CUIDADOS ESPECIAIS

Dos 3 aos 18 meses de idade dosifique a intervalos mais curtos. Principalmente durante o verão e outono.